



LE FRAISIER :

CULTURE DE PREMIÈRE ANNÉE

De fréquents binages sont nécessaires pour maintenir le sol propre, exempt de mauvaises herbes, sauf si traité avec *Desherbant fraisiers* 93515 . Arroser copieusement par année sèche.

FAUT-IL LAISSER DES COULANTS ?

Il est préférable de les supprimer, sauf en cas de culture espacée par bandes (80 cm), laisser autour de chaque plante-mère se développer une couronne de stolons, mais ne garder que les premiers fraisiers.

Favoriser leur enracinement en maintenant la terre meuble.

Supprimer les fraisiers issus de fins stolons et laisser toujours un intervalle vide et propre entre les bandes de fraisiers. Ne jamais laisser les coulants s'enchevêtrer car ils épuiseraient le sol et s'étoufferaient.

DESHERBAGE CHIMIQUE

15 jours à 3 semaines après la plantation, en février pour les plantations d'automne, détruire la mauvaise herbe annuelle définitivement en pulvérisant ou en arrosant **Desherbant fraisiers 93515** entre les rangs, sur terre fine, non motteuse préalablement nettoyée par binage.

Incorporer dans la couche superficielle du sol par ratissage.

Contre les liserons, renoncules, pissenlits, pulvériser un **anti-liseron** sur fraisiers de plus d'un an, après récolte.

PAR ÉPOQUE SÈCHE, LE FRAISIER AIME L'EAU

Pendant la période de la récolte, le temps sec peut diminuer cette dernière de 4/5, car le fruit contient 90 % d'eau, il est donc rentable d'arroser si l'on ne veut pas perdre les 4/5 de la récolte.

MALADIES ET INSECTES NUISIBLES

Le plus terrible ennemi est la pourriture grise ou botrytis qui détruit la moitié, parfois la totalité de la récolte par année humide. Enlever les fruits pourris, ne pas les jeter entre les rangs, les enterrer profondément ou les brûler.

On écarte définitivement ce fléau, en pulvérisant préventivement 15 jours avant, pendant, et 15 jours après floraison **Maladies du Potager 93330**.

- **Tâches pourpres, arrondies devenant blanches au milieu (feuilles rouges). Au départ de la végétation, avant floraison, et après la récolte, Maladies du Potager 93330 Faucher les feuilles en automne et les brûler.**
- **Blanc, oïdium, (feuilles et pousses blanchâtres), Anti-maladies Polyvalent avant floraison et après récolte.**
- **Racines coupées ou rongées : vers blancs, taupins, vers fil de fer, charançons du pivot : Insectes du sol 93837 en épandage.**
- **Limaces : épandre à la volée Anti-limace granulés 93717 de préférence le soir sur sol humide (500 grs par are).**
- **Feuilles décolorées, cloquées : araignées rouges : Insectes choc 93324 en applications répétées ou 2-3 pulvérisations à 10 jours d'intervalle, avant floraison, en mouillant le dessous des feuilles. Renouveler après récolte.**
- **Pucerons : transmettant le virus de la dégénérescence : DECIS J 93325 dès leur apparition, pas pendant la fructification, ou Insectes chocs 93324 pour petites cultures.**
- **Blaniules, mille-pattes minuscules brun-gris dans les fruits (se roulent en spirale quand on les saisit) pourriture des fruits. Chauler les sols humides avant plantation, incorporer Mouches des Légumes 93518.**

INTÉRÊT DES FILMS POLYÉTHYLÈNE DANS LA CULTURE DU FRAISIER

Forçage sous tunnel transparent : pour des récoltes plus précoces et plus propres, un entretien plus facile.

Plantation sur film noir : pas de mauvaises herbes et meilleure résistance à la sécheresse (Moins d'arrosages).